

/// CEREALES Y OLEAGINOSAS

Resultados RECSO Balcarce 2025/26

Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja Región Pampeana Sur
Marina Montoya, Carlos Antonelli, Mauro Zabaleta, Carla Maringolo



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina

Estación Experimental
Agropecuaria
Balcarce

CONICET



I P A D S

INTA
Ediciones 

CEREALES Y OLEAGINOSAS

Resultados RECSO Balcarce 2025/26

Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja¹

Región Pampeana Sur

(Versión compacta)

Montoya, Marina R.A.^{1,2}; Antonelli, Carlos²; Zabaleta, Mauro²; Maringolo, Carla²

¹Responsable de ensayo: montoya.marina@inta.gob.ar

²Grupo Patología Vegetal, IPADS Balcarce.

Características de los ensayos en Balcarce

Sitio: EEA INTA Balcarce (LS 37° 45' 40"; LW 58° 17' 55").

Fecha de siembra: 13/11/2025.

Fecha de emergencia (promedio): 21/11/2025.

Fecha de cosecha: 05/05/2026.

Manejo: siembra sobre rastrojo de maíz, en seco.

Herbicidas: 19/12/25: glifosato 2 L/ha; cletodim 1 L/ha, fomesafen 1 L/ha; coadyuvante 1,7 L/ha.

Parcela sembrada: 4 surcos de 6 m de largo a 0,52 m.

Diseño: bloques completos aleatorizados; 3 repeticiones / cultivar.

Parcela cosechada: 2 surcos (centrales). Superficie aprox. 3,50 a 6,24 m²

LLUVIAS registradas en Estación Meteorológica IPADS Balcarce (mm):

Set. 25	Oct. 25	Nov. 25	Dic. 25	Ene. 26	Feb. 26	Mar. 26	Abr. 26	Acumulado
92,6	119,6	33,5	104,5	23,7	32,4	66	108	579,3

Referencias generales

Diferencia respecto del rinde ensayo (%): diferencia de rinde del cultivar en relación al rinde medio del ensayo del GM en el sitio y la campaña según el test LSD al 5%.

Diferencia respecto del rinde testigo (%): diferencia de rinde del cultivar en relación al rinde medio del testigo del GM en el sitio y la campaña según el test LSD al 5%.

Días a R1, R5: días desde la emergencia a la ocurrencia de dichos estadios.

Fecha R1, R5: fecha promedio de ocurrencia de los estadios R1 y R5.

Altura: altura promedio en cm en R8.

¹Actividades enmarcadas y cofinanciadas por Convenio de Vinculación Tecnológica INTA/ASA, RECSO; Instrumento INTA RIST.1226 - Red de evaluación de cultivares.

Tabla 1. Rinde medio de cultivares de soja grupo de madurez 3 CORTO, RECSO Balcarce, Buenos Aires, campaña 2025/2026.

Cultivar	Criadero	Rinde (Kg/ha)	Rinde máximo ("máx") y los que no se diferenciaron de él ("a")	Índice c/promedio ENSAYO (%)	Índice c/promedio TESTIGO (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Altura (cm)
BRV3325	Brevant	1898	máx	117	115	15-ene	56	17-feb	89	58
SESTINE 31EC21	Stine	1721	a	106	105	11-ene	52	17-feb	88	57
DM 33E22 SE (testigo)	Don Mario	1646	a	102	100	14-ene	54	19-feb	90	56
DM 33R22	Don Mario	1456		90	88	16-ene	56	19-feb	91	58
NEO 35S23 SE	Neogen	1366		84	83	13-ene	53	19-feb	90	60
Promedio (kg/ha)		1617				14-ene	54	18-feb	90	58
Desvío estándar (kg/ha)		130								
Dif. Mín. Signif. (kg/ha)		422								
CV (%)		13,9								

Tabla 2. Rinde medio de cultivares de soja grupo de madurez 3 LARGO, RECSO Balcarce, Buenos Aires, campaña 2025/2026.

Cultivar	Criadero	Rinde (Kg/ha)	Rinde máximo ("máx") y los que no se diferenciaron de él ("a")	Índice c/promedio ENSAYO (%)	Índice c/promedio TESTIGO (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Altura (cm)
3925 E	Nidera	1894	máx	113	127	20-ene	60	22-feb	94	74
DM38E26 SE	Don Mario	1701	a	102	114	14-ene	54	19-feb	90	56
38EF52 STS	Stine	1591	a	95	107	13-ene	53	20-feb	92	62
P38A01SE (testigo)	Pioneer	1489		89	100	14-ene	54	23-feb	94	60
Promedio (kg/ha)		1669				15-ene	55	21-feb	93	63
Desvío estándar (kg/ha)		106								
Dif. Mín. Signif. (kg/ha)		367								
CV (%)		11								

Tabla 3. Rinde medio de cultivares de soja grupo de madurez 4 CORTO, RECSO Balcarce, Buenos Aires, campaña 2025/2026.

Cultivar*	Criadero	Rinde (Kg/ha)	Rinde máximo ("máx") y los que no se diferenciaron de él ("a")	Índice c/promedio ENSAYO (%)	Índice c/promedio TESTIGO (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Altura (cm)
DM40E25 SE	Don Mario	2122	máx	125	140	18-ene	58	25-feb	97	62
P42A25E	Pioneer	1863	a	109	123	19-ene	59	24-feb	96	62
41MS01 STS	Macroseed	1857	a	109	123	18-ene	59	22-feb	94	64
BRV4124SE	Brevant	1824	a	107	120	18-ene	58	24-feb	95	56
STINE 40EC53	Stine	1784	a	105	118	17-ene	58	24-feb	96	62
BG540	Santa Rosa	1761	a	103	116	20-ene	60	24-feb	95	56
STINE 43EE53 STS	Stine	1608	a	94	106	21-ene	61	25-feb	97	64
Seedco40R23STS	Seedco	1638	a	96	108	19-ene	59	24-feb	95	58
CZ 4021 STS	Basf	1587	a	93	105	21-ene	62	24-feb	95	63
DM40R26	Don Mario	1585	a	93	105	15-ene	55	22-feb	94	64
40MS01 E STS (testigo)	Macroseed	1514		89	100	16-ene	57	24-feb	95	55
NEO 42S25 RR STS	Neogen	1295		76	86	19-ene	59	23-feb	94	56
Promedio (kg/ha)		1703				18-ene	59	24-feb	95	60
Desvío estándar (kg/ha)		195								
Dif. Mín. Signif. (kg/ha)		573								
CV (%)		20								

* Ensayo no considerado en análisis conjunto del GM por poseer valores de C.V. fuera de rango requerido. Cultivar Seedco44R23 STS no evaluado.

Tabla 4. Rinde medio de cultivares de soja grupo de madurez 4 LARGO, RECSO Balcarce, Buenos Aires, campaña 2025/2026..

Cultivar*	Criadero	Rinde (Kg/ha)	Rinde máximo ("máx") y los que no se diferenciaron de él ("a")	Índice c/promedio ENSAYO (%)	Índice c/promedio TESTIGO (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Altura (cm)
47MS02 STS	Macroseed	2210	máx	118	145	18-ene	59	25-feb	96	63
NORD4824SE	Nord	2175	a	116	142	20-ene	60	24-feb	96	65
At2907	Santa Rosa	2158	a	115	141	18-ene	58	24-feb	96	61
DM 49R26	Don Mario	2146	a	115	140	20-ene	61	25-feb	96	63
BRV4524SE	Brevant	2047	a	109	134	20-ene	60	23-feb	95	65
DM 47E23 SE	Don Mario	2000	a	107	131	21-ene	61	24-feb	95	65
P46A03SE	Pioneer	1967	a	105	129	21-ene	61	24-feb	95	66
NEO 47S25 SE	Neogen	1966	a	105	129	15-ene	56	23-feb	94	62
48MS02 E STS	Macroseed	1958	a	105	128	20-ene	60	24-feb	96	59
DM46E25 SE	Don Mario	1885	a	101	123	19-ene	59	24-feb	95	65
NORD4624E	Nord	1846	a	99	121	20-ene	60	24-feb	95	65
47x24 E STS NK	NK	1813	a	97	119	20-ene	61	24-feb	95	60
BRV4824SE	Brevant	1788	a	95	117	16-ene	56	24-feb	95	67
DM46R25	Don Mario	1779	a	95	116	19-ene	59	24-feb	96	59
CZ 4625 STS	Basf	1748	a	93	114	20-ene	61	23-feb	95	61
NEO 46S25 SE	Neogen	1705	a	91	111	21-ene	61	25-feb	97	59
STINE 47EA32	Stine	1627		87	106	17-ene	58	24-feb	95	60
4634 E STS NS	Nidera	1566		84	102	20-ene	61	25-feb	96	59
STINE 48EC53	Stine	1554		83	102	24-ene	64	25-feb	96	64
STINE 46EA23 (testigo)	Stine	1529		82	100	17-ene	57	24-feb	95	64
Promedio (kg/ha)		1873				19-ene	60	24-feb	96	63
Desvío estándar (kg/ha)		191								
Dif. Mín. Signif. (kg/ha)		550								
CV (%)		18								

*Ensayo no considerado en análisis conjunto del GM por poseer valores de C.V. fuera de rango requerido. Cultivar Stine 45EB52STS debió ser descartado

Para ver los resultados completos de la **RECSO 2025/2026** en todas las localidades de Argentina, clicar en los siguientes enlaces:

RECSO 2025/2026



Agradecimientos

A los Sres. Diego Santos (IPADS Balcarce), Silvio Giuliano (Servicios Centrales IPADS Balcarce), Federico Miri (Comunicación IPADS Balcarce) y Facundo Marcos Valle (provisión de inoculante elaborado en Lab. Microbiología FCA, UNMdP).



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria



Ministerio
de Economía
República Argentina

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca